



Pour nous contacter :

CRA Bourgogne

www.crabourgogne.org

Unité régionale clinique

CHU du Bocage
Ecole des cadres infirmiers
10 bd Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77908 – 21077 DIJON cedex

Téléphone : 03 80 29 54 19

Mail : cra@chu-dijon.fr

**Unité régionale d'information
et de documentation**

Sise au CREA1 de Bourgogne
11 rue Jean Giono – BP 76509
21065 DIJON cedex

Téléphone : 03 80 28 84 40

Mail : creai@creibourgogne.org

LES SIGNES PRECOCES DE L'AUTISME



**L'autisme est un trouble sévère du développement
de l'enfant qui se manifeste avant l'âge de 3 ans.**

**En tant que professionnel de la petite enfance, vous êtes
l'un des premiers acteurs susceptibles de détecter les
signes précoces de l'autisme et d'orienter les familles
vers un service spécialisé dans le diagnostic de
l'autisme.**



Les signes d'alerte pouvant évoquer l'autisme

Avertissement : pris isolément, chacun de ces signes n'est pas caractéristique de l'autisme. C'est la présence simultanée et la persistance de plusieurs de ces symptômes dans chacune des quatre catégories qui doit vous alerter.

	INTERACTIONS SOCIALES	COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE	COMPORTEMENTS ET INTÉRÊTS	ASPECTS TONIQUES ET MOTEURS
0 à 6 mois	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Absence ou rareté du sourire social ◆ Anomalies du regard (fugace, de côté, vague, évitant) ◆ Pas d'anticipation (ne tend pas les bras pour être pris) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Passivité ◆ Impression d'anormalité (bébé trop calme ou excité) ◆ Suspicion de surdit� ◆ Peu de vocalisations 		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Anomalies motrices, défaut d'ajustement dans les bras : bébé mou ou trop raide ◆ Troubles du sommeil, insomnie calme ◆ Pleurs tr�s fr�quents sans raison apparente
6 à 12 mois	<ul style="list-style-type: none"> ◆ D�sint�r�t pour les personnes ou le monde ext�rieur ◆ Ne r�agit pas � son pr�nom ◆ Intol�rance au contact ◆ Peu de r�action � la s�paration, � l'arriv�e des parents ◆ Regard difficile � capter ◆ Pas d'attention conjointe 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pas d'imitation dans la communication gestuelle (coucou, bravo, etc.) ◆ Pas de babillage 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sensibilit� excessive aux modifications de l'environnement (changement de place d'objets, changements dans l'emploi du temps) ◆ R�actions atypiques aux bruits 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Troubles de l'alimentation (difficult� � passer � la nourriture solide, habitudes alimentaires), troubles digestifs possibles ◆ Retard moteur ou h�t�rog�n�it� du d�veloppement (certains domaines sont acquis et d'autres non)
12 � 24 mois	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ne pointe pas du doigt ◆ Semble ignorer les autres ◆ Semble pr�f�rer �tre seul ◆ Pas de jeu de faire semblant (d�nner, petites voitures, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Absence ou retard de langage ◆ Absence d'imitation ◆ Ne semble pas comprendre ce qui lui est dit 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Manipulation �trange des objets (tournoisements, alignement, flairage) ◆ Mouvements inhabituels du corps (balancement, battements rapides des mains) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pas de geste de protection lors d'une chute
A partir de 24 mois	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Absence d'int�r�t pour les autres enfants ◆ Absence ou pauvret� du jeu 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Langage sans intention de communiquer : monologue, r�p�tition... ◆ Tendence � r�p�ter (�cholalie) ◆ Fa�on inhabituelle de parler (voix atone ou chantante) ◆ Inversion des pronoms (« tu » � la place de « je ») 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Attachement aux objets plut�t qu'aux personnes ◆ Insistance � poursuivre des actes routiniers ◆ Difficult�s face au changement ◆ Utilise la main d'autrui pour attraper quelque chose 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Auto ou h�t�ro agressivit� ◆ Instabilit� �motionnelle : rires ou larmes sans raison apparente ◆ Hypo ou hypersensibilit� : � la douleur, au contact des v�tements, de l'eau, ...

Items en gras : signes d'alerte absolue